

Cortinarius duracinus

(*Frie var. raphanicus* Moser.)

Jean-Michel Faibella. *

Gueuroz (Vernayaz, Valais, Suisse)

15 janvier 2007

Altitude 750 m

Bord de chemin (terre nue)

Macroscopie :

Chapeau; diam.15-50mm hémisphérique, à aplani, légèrement mamelonné.

brun rougeâtre à brun clair, lisse, mate, reste de voile blanchâtre dans la jeunesse higraphane.

Chair : brun clair à crème, odeur raphanoïde, à la base du pied.
saveur douce à raphanoïde

Lames : épaisses, brunes à cannelles, largement adnées

Pied : 30-80 x 5-12mm fusiforme, radicant, flexible, surface mate, blanche soyeuse, vague zone annulaire sous le chapeau.

Microscopie :

Spores : éllipsaïdales, verruqueuses, ocracées 8,0/9,5x4,6/5,8 ym sporée ocre.

Basides : têtрасporiques 40/46 x 7/10 ym bouclées

Cellules marginales : cylindriques, bouclées 20/32 x 5/8,5 ym

Cuticule : hyphes parallèles, quelques-unes émergentes, légèrement pigmentées, bouclées.

Remarques : la variété raphanicus se distingue surtout par son odeur raphanoïde.


Les exemplaires photographiées au mois de janvier expliquent peut-être le fait que leur dimension soit plus petite que donné dans la littérature.

Réf : BK N° 5 N° 318, Bon p. 219, Cetto N° 3 N° 958.


*Jean-Michel Faibella Bt. postale 732 Gueuroz 1920 Martigny.

Tél. 079 622 59 83

Spores



Basides



Cellules
marginales

